





NAJÚČINNEJŠÍ DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK

Baktericidný účinok	Koncentrácia	Testovacia metóda
<i>Bacillus cereus</i>	1:400	AFNOR Tt 72-190
<i>Bacillus subtilis</i> var. <i>Niger</i>	1:400	AFNOR Tt 72-190
<i>Bordetella avium</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Campylobacter jejuni</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Corynebacterium pseudotuberculosis</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Enterococcus hirae</i>	1:400	EN 1040; EN 1276; EN 1656
<i>Escherichia coli</i>	1:400	AOAC, USA; EN 1040; EN 1276; EN 1656; AFNOR T 72-190; EST test
<i>Haemophilus paragallinarum</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Listeria monocytogenes</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Mycobacterium smegmatis</i>	1:400	AFNOR T 72-190; EST test
<i>Mycoplasma gallisepticum</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Mycoplasma synoviae</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Ornithobacterium rhinotracheale</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Pasteurella multocida</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Proteus mirabilis</i>	1:400	EST test
<i>Proteus Vulgaris</i>	1:400	EN 1040; EN 1276; EN 1656
<i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	1:400	AOAC, USA; AFNOR T 72-190; EST test
<i>Salmonella Choleraesuis</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Salmonella Choleraesuis</i> serotype <i>enteritidis</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Salmonella</i> serotype <i>serotype pullorum</i>	1:256	AOAC, USA
<i>Salmonella choleraesuis</i> subsp. <i>choleraesuis</i> , serotype <i>typhisuis</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Staphylococcus Aureus</i>	1:400	AOAC, USA; EN 1040; EN 1276; EN 1656; AFNOR T 72-190; EST test
<i>Streptococcus faecium</i>	1:400	AFNOR T 72-190; EST test
<i>Streptococcus suis</i>	1:400	AOAC, USA
Fungicidný účinok		
<i>Aspergillus Fumigatus</i>	1:200	EST test
<i>Candida Albicans</i>	1:400	AFNOR T 72-190; EST test
<i>Fusarium dimerum</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Penicillium expansum</i>	1:400	AOAC, USA
<i>Penicillium verrucosum</i> var. <i>Cycloplium</i>	1:400	AFNOR T 72-190
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1:400	AFNOR T 72-190; EST test
<i>Tricophyton mentagrophytes</i>	1:400	AOAC, USA
Virocidný účinok		
Aujesky (<i>Pseudorabies virus</i>)	1:400	AOAC, USA; AFNOR 86081
Avian Influenza H5N1	1:1200	Klein-Defors Embryonated Chicken Test
Avian Influenza H5N1	1:400	FAO - OIE Test
Avian Influenza H9N2	1:400	AOAC, Embryonated Chicken Test
Avian Laryngotracheitis virus	1:400	AOAC, USA
Avian Reovirus	1:256	AOAC, USA
Classical Swine Fever	1:400	AFNOR 86081
Foot and mouth disease	1:200	AFNOR 86081
Gumboro (Infectious Bursal Disease)	1:400	AOAC, USA
Infectious Pancreatic Necrosis	1:66	v morskej vode 4°C, 2%-né organické zataženie
Marek's Disease virus	1:400	AOAC, USA
Newcastle Disease virus	1:400	AOAC, USA; AFNOR 86081
Porcine circovirus type II	1:200	AOAC, USA
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome virus	1:400	AOAC, USA
Reovirus	1:200	AFNOR 86081

Testovanie v zmysle AOAC metód: za prítomnosti najmenej 5% organických látok a v 400 ppm tvrdej vode.

ZOZNAM NEOBSAHUJE VŠETKY TESTY. NA POŽIADANIE VÁM POSKYTNEME BLIŽŠIE INFORMÁCIE A VÝSLEDKY TESTOV.



AGRORM - Monika Rukovánsky

Družstevná 1064, Selice, 92572

tel.: +421-911-787 772, +421-911-750-923

www.agrorm.sk, agrorm@sgnet.sk

Váš dodávateľ:



GLOBALNÝ DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK

EFEKTÍVNY DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK



REGISTRÁCIE:

CCHLP-bio/226/D/07/2 – SR

EN – Európska únia

AFNOR – Francúzsko

DEFRA – UK

EPA - USA

HSN1 - Čína



www.virocid.com

- ZNIČÍ VŠETKY CHOROBOPLODNÉ

MIKROORGANIZMY

- MÁ SYNERGICKÉ ZLOŽENIE

- JE DLHODOBO ÚČINNÝ

- ZARUČUJE EKONOMICKÉ RIEŠENIE

PROBLÉMOV V HYGIENE

- HODÍ SA NA DEZINFEKCIU V ZDRAVOTNÍCTVE

MNOHOSTRANNÉ VÝHODY



- *Ekologický dezinfekčný prostriedok vhodný aj do nemocničného prostredia*
- *Dokázaný účinok proti baktériám (gram-, gram+ a spóram), vírusom (zapuzdreným, nezapuzdreným) a hubám*
- *Dlhodobý účinok*
- *Nevypetuje sa žiadna rezistencia*
- *Účinnosť pri nízkej koncentrácii*
- *Možnosť použitia vo forme postreku, peny, hmly, v dezinfekčných brodoch na obuv a kolesá vozidiel*
- *Neobsahuje ťažké kovy*
- *Účinnosť pri všetkých teplotách (aj pri teplote okolo bodu mrazu)*
- *Účinnosť v širokej škále pH a v tvrdej vode (aj morskej)*
- *Účinnosť v prítomnosti organických látok*
- *Nekoroduje stroje a zariadenie (neutrálne pH)*
- *Nemá karcinogénny účinok, nie je toxický pre zvieratá a ľudí, je šetrný voči životnému prostrediu*

SYNERGICKÉ ZLOŽENIE

- VIROCID®** obsahuje 5 aktívnych zložiek:
- 2 rôzne kvartérne amónne zlúčeniny (1 jednoduchý reťazec-C12-16 –alkyl(benzyl) dimetylamónium –chlorid : 170,6 g/l (17,06%) a 1 rozvetvený reťazec: didecyl (dimetyl) amónium chlorid: 78 g/l (7,8%),
 - bezpečný moderný aldehyd, ktorý sa používa v humánnej medicíne: glutáraldehyd 107,25 g/l (10,73%)
 - alkohol: izopropanol: 146,25 g/l (14,63%)
 - borovicový olej: 20 g/l (2%)
 - Spolu: 522,1 g/l (alebo 52,21%)
 - + pufračné látky, stabilizátory, sekvestrujúce zložky,

BALENIE

1 L - 5 L - 10 L - 20 L - 200 L

POUŽITIE

- Živočišna výroba
- Liahne
- Preprava zvierat (nákladné autá, prívesy)
- Chovateľská technológia
- Príručné sklady a miestnosti na farmách
- Chladiarenské panely
- Dezinfekčné brody na obuv
- Dojarská technológia
- Aquakultúra
- Potravinárska výroba
- Nemocnice
- Záhradníctvo
- Zoologické záhrady
- **V prípade infekčných ochorení – prevencia!**

KONCENTRÁCIA A POUŽITIE

FARMY A VETERINÁRNE AMBULANCIE

- 1.) Dezinfikované povrchy očistíte vhodným CID LINES čistiacim prostriedkom.
 - 2.) Po opláchnutí a vyschnutí aplikujete dezinfekčný prostriedok **VIROCID®** v 0,25%-0,5% koncentrácii postrekom (1l roztoku na 4 m²).
- Pre fogovanie používajte riedenie 1:4 (1 l **VIROCID®** + 4 l vody/1000 m³).



PREPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE ZVIERATÁ

- 1.) Dezinfikované povrchy očistíte vhodným CID LINES čistiacim prostriedkom.
 - 2.) Po opláchnutí a vyschnutí aplikujete dezinfekčný prostriedok **VIROCID®** v 0,5% -nej koncentrácii.
- V dezinfekčných brodoch na kolesá používajte **VIROCID®** v 1% koncentrácii.



SKLADY POTRAVIN A KRMÍV, SPRACOVATEĽSKÉ MIESTNOSTI

- 1.) Dezinfikované povrchy očistíte vhodným CID LINES čistiacim prostriedkom.
- 2.) Po opláchnutí a vyschnutí aplikujete dezinfekčný prostriedok **VIROCID®** v 0,25 -0,5% -nej koncentrácii.
- 3.) Po uplynutí 20 minút povrchy opláchnite čistou pitnou vodou.



PREPRAVNÉ PROSTRIEDKY NA POTRAVINY

- 1.) Dezinfikované povrchy očistíte vhodným CID LINES čistiacim prostriedkom.
- 2.) Po opláchnutí a vyschnutí aplikujete dezinfekčný prostriedok **VIROCID®** v 0,25 -0,5% -nej koncentrácii.
- 3.) Po uplynutí 15 minút povrchy opláchnite čistou pitnou vodou.



DEZINFEKČNÉ BRODY NA OBUV

Brody naplníte 1% roztokom **VIROCID®**, ktorý obnovujete 2-3 razy týždenne.

RYBÁRSKE NÁRADIE, NÁDRŽE NA ŽIVÉ RYBY

- 1.) Dezinfikované povrchy očistíte vhodným CID LINES čistiacim prostriedkom.
- 2.) Po opláchnutí aplikujete dezinfekčný prostriedok **VIROCID®** v 1,5% -nej koncentrácii (v studenej morskej vode).

